



(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per melo, vite e patata.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Durante le operazioni di miscelazione e caricamento del prodotto indossare sempre guanti e tuta/abbigliamento da lavoro.

Per applicazione su patata, indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro. Per applicazione su vite, melo mediante trattore cabinato, indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro. In caso di applicazione su melo mediante trattore non cabinato, indossare guanti, tuta da lavoro con cappuccio e visiera. In caso di applicazione su vite mediante trattore non cabinato, indossare guanti, tuta da lavoro con cappuccio, visiera o maschera pieno facciale e protezione respiratoria (FFP2 o P2).

In caso di applicazione su melo, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da aree non destinate all'uso agricolo al fine di proteggere gli astanti. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazioni di rifinitura manuale (es. diradamento manuale dei frutti) su melo o pero prima che siano trascorsi 5 giorni dall'ultimo trattamento.

Trascorsi 5 giorni è possibile effettuare operazioni di rifinitura manuale indossando guanti protettivi. Non effettuare operazioni di rifinitura manuale (es. diradamento fogliare) su vite prima che siano trascorsi 17 giorni dall'ultimo trattamento. Trascorsi 17 giorni è possibile effettuare operazioni di rifinitura manuale indossando guanti protettivi.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Meccanismo d'azione: gruppo 29 (FRAC)

In caso di applicazioni su vite, per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

In caso di applicazioni su pomacee, per proteggere gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di 30 metri dal più vicino corpo idrico; in alternativa non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri dal più vicino corpo idrico e trattare l'ultima fila di alberi solo verso l'interno.

NORME PRECAUZIONALI

Si consiglia di sciacquare il contenitore almeno due volte dopo l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE

Terapia: sintomatica. Avvertenza: **Consultare un Centro Antiveleni.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE
NORME VIGENTI.**


**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

CONSULTARE IL LIBRETTO PRIMA DELL'USO

NAIROBI 500 SC - COMPOSIZIONE
FLUAZINAM puro g 40,2 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100,0

UFI: VFV2-80V2-600F-PNSP

ATTENZIONE



**Registrazione del Ministero della
Salute n. 18864 del 13.01.2025**

INDICAZIONI DI PERICOLO

H361d Sospetto di nuocere al feto.

H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene fluazinam.

Può provocare una reazione allergica.

EUH401 Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.

*Fare riferimento al foglietto illustrativo del prodotto
per informazioni complete sulla sicurezza.*

Titolare della registrazione
JT AGRO EUROPE sp. z o.o.
Gate A, Aleja Grunwaldzka 472
80-309, Gdansk, Polonia
Tel +44 1484 848885

Officine di produzione
JT Grosvenor Ltd.
Lees Mill Lane
Linthwaite
Huddersfield
HD7 5QE
Regno Unito

PROTEGGERE DAL GELO AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

Numero di lotto: vedere sulla confezione

Contenuto netto
12x1Le

Distribuito da:
Chemia S.p.A.,
Via Statale n.327 - 44047 Dosso (Ferrara)
Tel +39 0532 848477

